

SKUBIOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS MASTAS

Skubiosios medicinos pagalbos kategorija	Laikas, per kurį turi būti pradėta teikiti pagalbą	Kategorijos apibūdinimas	Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos
1	2	3	4
1 kategorija	Nedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai.	Gyvybei grėsmingi atvejai: gyvybei grėsminges būklės, kai aktyvi medicininė intervencija reikalinga nedelsiant.	1. Sunkūs psichikos sutrikimai su pavojingais agresyviais veiksmais sau ar aplinkiniams.
2 kategorija	Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Paciento būklė vertinama ir gydymo veiksmai dažnai atliekami vienu metu.	Atvejai, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, neišvengiamai gresia paciento gyvybei.	1.Psichikos ir elgesio sutrikimai: 13.1 13.1 agresija arba smurtas, keliantys grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams; 13.2 13.2 intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinius asmens laisvės suvaržymas dėl grėsmės sau ar aplinkiniams.
3 kategorija	Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.	Potencialios grėsmės gyvybei, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes, jei gydymas nebus pradėtas per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, arba kitos būklės, kai nesuteikus pagalbos per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pasekmės gali būti ypatingai sunkios,	1. Psichikos ir elgesio sutrikimai: 14.1. mėgiminimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmę; 14.2. ūmios psichozės; 14.3. sunki psychologinė trauma, dezorganizuojanti elgesį; 14.4. sunki depresija; 14.5. ryškus psichomotorinis sujaudinimas.
4 kategorija	Paciento būklės vertinimas ir/ar gydymas Turi būti pradėti ne vėliai kaip per 1 val nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą	Potencialios grėsmės paciento svaikatai, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes, jei gydymas nebus pradėtas per 1 val nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba kitos būklės, kai nesuteikos pagalbos per 1 val nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasekmės gali būti sunkios.	Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis dėl rizikos veiksnių (anamnezėje buvo psichozės, traukulių: gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir lėtinių ligų; kompulsyvus potraukis psychoaktyvioms medžiagoms).